



Kako prepoznati papatače (nevide)?

Identifikacija papatača uključuje identifikaciju nekoliko morfoloških osobitosti. Na temelju ovih karakteristika možete ih razlikovati od ostalih malih insekata:

Veličina



Papatači su mali, obično dugi 1 do 3 milimetra.

Krila



Papatači imaju duga, uska krila koja stoje uspravno u obliku slova V iznad tijela kada miruju. Krila su često dlakava i imaju karakteristično istaknute žile.

Kretanje



Za kretanje papatača je karakteristično skakanje ili kratki let umjesto neprekidnog leta.

Boja



Obično su svijetle, zlatne ili pješčane boje.

Tijelo i noge



Tijela su im dlakava i krhka, s dugim i tankim nogama.

Ponašanje



bodu samo ženke papatača, jer im je potrebna krv za razvoj jaja. Najaktivniji su u zoru i sumrak. Lete nečujno i većina ljudi nije svjesna da su ih uboli.

Tragovi uboda



Ubodi papatača često su bolni i mogu izazvati crvene otekline koje svrbe.

Ako vas ubode papatač (ili sličan kukac), slijedite ove upute kako biste umanjili učinke uboda i smanjili rizik od komplikacija:

Očistite mjesto uboda

1

Temeljito operite mjesto uboda sapunom i vodom kako biste smanjili rizik od infekcije.

Nanesite antiseptik

2

Koristite antiseptičku kremu ili losion kako biste spriječili infekciju.

Smanjite svrbež i oteklinu

3

Stavite hladan oblog ili oblog od leda na mjesto uboda kako biste smanjili oteklinu i ublažili svrbež.

Koristite bezreceptne kreme protiv svrbeža, kao što je hidrokortizonska krema, ili uzmite oralni antihistaminik.

Izbjegavajte češanje

4

Češanje uboda može dovesti do infekcije. Držite nokte kratkim i čistim kako biste smanjili štetu ako je grebanje neizbježno.

Pripazite na simptome

5

Papatači ponekad svojim ubodom mogu prenijeti uzročnike bolesti kao što je lišmanioza. Obratite pažnju na simptome kao što su:

Trajno crvenilo, oteklinu ili bol na mjestu uboda;

Groznica ili zimica;

Pojava ranica ili čireva na mjestu uboda.

Potražite liječničku pomoć

6

Ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma ili ako mjesto uboda pokazuje znakove infekcije (kao što je pojačano crvenilo, toplina, gnoj ili crvene pruge), posjetite liječnika.

Spriječite buduće ubode

7

Koristite repelent za insekte, nosite odjeću dugih rukava i hlače i izbjegavajte područja gdje su papatači uobičajeni kako biste smanjili vjerojatnost budućih uboda.

